



ОБЩИЕ СИМПТОМЫ

- Лихорадка
- Беспричинная общая слабость
- Утомляемость
- Апатия
- Снижение трудоспособности
- Депрессия
- Утрата интереса к окружающему миру

СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

- Изменения голоса
- Нарушение глотания
- Изменения характера кашля



СО СТОРОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

- Снижение массы тела
- Нарушение аппетита
- Отвращение к некоторым продуктам питания
- Нарушение стула
- Пальпируемые образования в брюшной полости



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СИМПТОМЫ

- Лёгочные, желудочно-кишечные, маточные кровотечения; гематурия
- Постепенная нарастающая боль (сначала возникает периодически, имеет тупой или ноющий характер, со временем усиливается, становится острой, постоянной)
- Наличие ассиметричных, неровных, неоднородных по цвету, увеличенных в диаметре, быстро изменяющихся, растущих пигментных и беспигментных невусов
- «Незаживающие» язвы кожи, слизистых
- Обнаружение опухоли (молочные железы, лимфоузлы, подкожные образования, щитовидная железа)
- Деформация кожи молочной железы; выделения из соска при отсутствии лактации, особенно кровянистые; втяжение или фиксация соска; утолщение соска и складки ареолы



ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

- Ожирение
- Низкая физическая активность
- Курение
- Злоупотребление алкоголем



В случае, если вы отметили хотя бы 1 из перечисленных симптомов, необходимо обратиться к врачу