

Любовь «без границ»

Существует около 30 заболеваний, которые объединили в одну группу, потому что все они передаются человеку при сексуальных контактах, сокращённо их называют ИППП (инфекции передаваемые половым путем).

Классические венерические заболевания: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, лимфогранулематоз венерический.

ИППП с преимущественным поражением половых органов: хламидиоз, трихомониаз, кандидоз урогенитальный, микоплазмоз урогенитальный, герпес генитальный, остроконечные кондиломы (ВПЧ-инфекция), контагиозный моллюск, лобковый педикулез, чесотка

ИППП с преимущественным поражением других органов: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В (С, D, E), лямблиоз.

Ежегодно в мире регистрируется 500 млн. больных с ИППП.

Пути передачи

-Половой - во время половых контактов с зараженным человеком при вагинальном, оральном и анальном сексе.

-Парентеральный - при контакте с кровью больного, при использовании общих с больным человеком игл и шприцев при введении наркотических веществ.

-Контактно-бытовой путь передачи-при тесном телесном контакте с человеком, который имеет язвочки и другие высыпания, характерные для ИППП и очень редко при пользовании предметами обихода и гигиены больных людей.

-Внутриутробный путь передачи-передача инфекции от больной матери к ребенку внутриутробно и во время родов.

Общие признаки

-Зачастую протекают скрытно, без каких-либо ощущений со стороны больного.

-Без лечения отмечается тенденция к хронизации процесса, развитию осложнений.

-Инфицированные являются высоко заразными для окружающих, поэтому необходимо обязательное обследование и лечение половых партнеров.

-Сходность клинических проявлений различных ИППП, что требует обязательного подтверждения диагноза лабораторными тестами.

Симптомы

-Зуд и жжение в области половых органов.

-Частое, болезненное мочеиспускание.

-Необычные выделения и запах из половых органов.

-Покраснение в области половых органов и заднего прохода.

-Появление сыпи на теле.

-Язвочки, пузырьки, прыщики на половых органах, вокруг анального отверстия, во рту, на губах.

-Увеличение лимфатических узлов, особенно в паховой области.

-Боль внизу живота, боль во влагалище во время полового акта, кровянистые выделения из влагалища между менструациями - у женщин.

Осложнения

-Воспалительные заболевания матки и придатков.

-Женское бесплодие.

-Новообразования половых органов (рак шейки матки, рак вульвы).

-Невынашивание беременности.

-Осложнения при беременности и родах.

Диагностика

Выявить ИППП можно только при специальных исследованиях, для этого нужно получить консультацию врача дерматовенеролога, гинеколога, уролога.

Лабораторные тесты становятся положительными не сразу после полового контакта, а спустя некоторое время (для каждого заболевания оно своё – от 3-5 дней до нескольких недель и даже месяцев при ВИЧ-инфекции) от момента инфицирования.

Лечение

Назначает врач-дерматовенеролог с момента постановки диагноза.

Обязательное соблюдение режима и дозировки лекарственных препаратов;

Если ИППП не лечить, или заниматься самолечением, то они могут вызвать тяжёлые осложнения, а поздно

начатое лечение может быть неэффективным!

ПРОФИЛАКТИКА

Отказ от раннего начала половой жизни, исключение случайных половых связей.

Использование презервативов при каждом сексуальном контакте.

Не использовать нестерильные иглы, шприцы, чужие инструменты.

Соблюдать правила личной гигиены.

Не пользоваться чужими вещами (бельё, полотенца, одежду и прочее).

Воздержаться от употребления алкоголя и наркотических веществ. Под их действием часто совершаются необдуманные поступки.

Таким образом, риск заражения существует всегда, и ваша задача — снизить его.

Ваше здоровье — это залог здоровья ваших любимых, ваших близких и даже ваших детей.

Будьте аккуратней, берегите свое здоровье и не рискуйте